

hac etiam plures uenarum soboles in uniuersos propemodum femoris os ambientes musculos propagantur: inter cæteras autē præcipua finem eius^k uenæ, quam per pubis ossis foramen in femur delabi dictum est, ad se^l assumit, coq̃ adaucta, deorsum magis ad genu usque quodam modo inter musculos occultata descendit. Cæterum maxima uena sensim ad femoris os uersus posteriora contorta, ramulos oppidò quàm exiles^m grandioribus femur petentibus neruis offert, qui in membranas neruis obductas digeruntur. Deinⁿ aliam emittit propaginem, quæ in posteriorem femoris cutem excurrrens, furculos etiam sursum cutem subeuntes deriuat. Huic propagini frequenter à^o ramo quem in maximum corporis musculum dispensari diximus, soboles quædam accedit, quæ unâ cum ipsa commiscetur, & uena ex duabus confluens, sicut relatum est, cutem adit. Crebrius tamen^p duæ à grandi uena enascuntur propagines, una humilior altera. Hæ in progressu inuicem unitæ eam constituunt uenam, quæ hîc in cutem promittitur, ac ubi^q ramulos sursum in posteriorem femoris cutem germinauit, recto tramite deorsum per mediam flexus genu sedem seu poplitem ad suræ cutem descendit, ipsi^r numerosam ramulorum seriem porrigens, quæ sibi in omnibus minime correspondet. Verum ramulorum alij rectâ, alij oblique, alij transuersim in cutem excurrunt, & denuò nonnulli inuicē coeuntes permiscuntur ac uniuntur, & denique cum^t uenæ ramulis subinde coeunt, quam per cruris interiora decliuem sub cute ferri diximus. Arque, ut semel dicam, huiusmodi hæc uenarum implexus digestioq̃ conspicitur, ut cutem suræ uaricum affectu crebrius (perinde ac temporum & internæ cubiti sedis cutem) implicari non mirum sit. Præsens uena per genu flexus cutem in suram descendens, aliquando ad calcem usque prorepens inibi^u cessat, aliquando alijs ramulis per tibie exteriora huc pertinentibus comiscetur, & secundum^x exteriorē malleolū porrecta, pedis superiora adit, nonnunquā uerò & inferiora, nullibi interim in altum à cute demersa. Cæterum grandis uena femoris ossi quemadmodum scripsimus accumbens, adeò ipsi aduoluitur, ut iuxta genu articulum^y mediam inter duo humiliora femoris capita sedem occupet. Hic in duos impares ramos deducta^z interiorem (qui^a exteriori multo gracilior est) ad suræ musculos, præcipue uerò ad pedem mouentium^b primum & secundum, deorsum mittit, furculis quibusdam horum superficiem implicans, & subinde etiâ furculos in progressu ad internæ tibie sedis cutem^c dispergens. Quum uerò interior hic ramus ad tibie humiliorem usque appendicem^d perrepsit, atque in dictam nuper cutem furculos diffudit, sub interiori malleolo rehexus, internum pedis latus ad pollicem usque accedit, inibi in cutem ut plurimum absumptus. Rarius nanque inter calcem & tibie os unâ cum tendinibus hac pedis inferiora subeuntibus, ramus ille ad pedis digitos proficiscitur. Exterior ramus magnæ illius in poplite latitantis partitionis non procul ab exortu in binas rursus diducitur propagines, quarum^e maior eademq̃ interior penitus inter^f musculos posteriorem tibie sedem occupantes immergitur. Primum nanque inter capita primi secundiq̃ pedem mouentium musculorum rectâ descendit, ac dein inter quartum & quintum pedis motores, & deinde inter musculos digitorum flexus opifices hinc à tibia pronatos fertur, interdum etiam^g ligamentum cōtingens, quod fibulam tibie ossi secundum tibie longitudinem colligat. In hoc descensu interior hæc propago illis quos perreptat musculis ramulos offert, à quibus nulli, aut profectò longè paucissimi in cutem subeunt. Iuxta medium ferè longitudinis tibie præsens interiorq̃ propago in duos^h partitur ramos, quorum interior tali cum tibia articuloⁱ ramulum offert, ac totus quodammodo unâ cum tendinibus à posteriori tibie sede ad pedis inferiora reflexus inter calcem & tibie os pedis inferiora subit, & sub^j musculo secundos quatuor digitorum articulos flectente propagatus, duos furculos pollicis & item indici, medio autē digito unicum præbet, itaq̃ absumitur. Quamquam frequentissimè hic^k interioris illius propaginis ramus (quemadmodum & neruus pedis inferiora subiens) in omnes digitos digeritur, nullo ramo inter fibulam & calcem huc pedem^l accedente. Verum alter ramus qui eius diuisionis exterior est, quam paulo antè ad medium longitudinis tibie fieri dicebā, fibulæ exporrigitur: & quum ad infimam tibie sedem pertingit, atque ligamento membraneo, quod tota tibie longitudine fibulam tibie ossi committit, proximè est^m sobolem à se dispergit, quæ ligamentum perforans, unâ cum tendinibus per tibie anteriora pedis superiora adeuntibus in pedem fertur, acⁿ musculus pedis digitos in exteriora abducentibus furculos offert, quibusdam etiam ramulis in cutem sparsos. Quod autem alterius rami illius reliquum est, cum septimi & octauī pedem mouentium^o musculorum tendinibus in pedis humiliora proficiscitur, atque in minimos digitos dispēsat: nisi forte interior ramus inter tibie os calcemq̃ pedis inferiora petens, omnibus digitis furculos exhibeat. Varia enim hîc (si alicubi profectò) uenarum series occurrit, nam crebrò (quod etiam diligenter in sanguinis è uulncribus fluxu obseruandū est) conspicies^p interiorem illam propaginem, quam in po

in posteriori tibie sede inter musculos altè recondi dic contingit, d sobolem inter tibie os & fibulam per me secundum tibie longitudinem anteriori eius ligamen tur. Verum tunc propago illa quæ in posteriori tibie non amplius^q insigni diuisione dissecta, sed sola pedis terdum rursus inter musculos, anteriorem tibie sedem ca propagine quam nondum persecutus sum originer rior propago, exterioris rami magnæ in poplite diu dicem fertur: & quum à^r propagine quam tibie poste teriores tibie musculos nulla soboles per membraner propagine ramus inter septimum & sextum pedem m sobole digestus, in musculos anteriorem tibie ossis s rior propago in exterioris tibie sedis cutem potissimu præcipuo ipsius furculo nunc antrorsum, nunc retr pedis superiora accedit, & potissimum externum ped bus uenis commiscetur, nusquam in altum mergens. rum tibie & pedis cutem implicantium sit series, suaer dum præcepi, in uariorum hominum cruribus uincul contemplari, modò eam sobolem in superficie excurr pendendam duxeris. Ego enim parum superficialias nu ipse eas exercitij nomine non semel aperuerim: qu co, qui scilicet per inguina crus subit, principium duca m o. quàm^s quæ internum genu regionem perrepat, & in ris ligationem later, & dein^t quæ malleolos ambiunt. rer, qui cum alicubi legerint quatuor uenas ad pedis l cute enarraui) quatuor pedi adscribunt uenas, quas distinguunt, interim ignorantes ipsarum progressum & pedis superiori sede cum neruorum, tum tendinum o genu, atque ad malleolos cōstitit. ut modò elegantem præteream. Venarum autem quas illi statuunt, primā nalem nuncupant, atq̃ illam ad internum malleolum r ascribunt, illam Schiaticam nuncupantes. Quæ pollici dicitur, hancq̃ tertiam numerant. Quartam renalem c diuidentes. Quod uerò ad totius uenæ cauæ administr libris persequar, ubi earum partium quas interreptant ne quinti & sexti & septimi librorū accuratissimè. Na arteriarum & neruorum in manus ac crura pertinenti

DE VMBILICA

Caput XI.

NVDA umbilici uenæ delineatio, eius nimirum A uenæ sedem notat quæ umbilicum spectat, B uerò se uerò ipsius in iecoris substantia seriem ruditer exprime maxime spectantes ueniunt examinandæ, trigesima uid lucra cum ipso foetu proponit. Dein secunda eius libri fi nis serie relictam ostendit: ac insuper umbilici uenæ, s foetus urinā peculiariter educit. Præter alias eiusdem insertionem oculis subiiciunt, nimirum duodecima, & m